



15 W sezonie 2019 transportowałam/em przynajmniej raz rodziny na pożyczki w celu produkcji miodu lub świadczenia usług zapylania

a) tak b) nie c) nie wiem

16 Średnio, jaki procent plastrów wymienił/a Pan/i w rodzinie w 2019 r.?

a) 0% b) 1-30% c) 31-50% d) więcej niż 50%

17 Czy wymienione pożyczki w 2019 r. były wykorzystywane przez większość Pana/i rodzin?

sady	a) tak	b) nie	c) nie wiem
rzepak	a) tak	b) nie	c) nie wiem
kukurydza	a) tak	b) nie	c) nie wiem
wrzos	a) tak	b) nie	c) nie wiem
nawłóć	a) tak	b) nie	c) nie wiem
spadź	a) tak	b) nie	c) nie wiem

18 Czy w okresie kwiecień 2019 - marzec 2020 badał/a Pan/i stopień porażenia warrozą w swoich rodzinach pszczelich?

a) tak b) nie c) nie dotyczy

19 Czy w okresie kwiecień 2019 - marzec 2020 zwalczał/a Pan/i warrozę w swoich rodzinach pszczelich?

a) tak b) nie c) nie wiem/nie dotyczy

20 Proszę zaznaczyć w jakich miesiącach (w okresie kwiecień 2019 - marzec 2020) monitorował/a Pan/i stopień porażenia rodzin warrozą i wskazać kiedy rozpoczął/ęła konkretny zabieg przeciwwarrozowy w rodzinach produkcyjnych Metoda/Produkt	Miesiąc, w którym dane zabiegi lecznicze rozpoczęto:											
	2019									2020		
	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec
Badanie stopnia porażenia przez <i>Varroa destructor</i>												
Wycinanie czerwiu trutowego												
Hipertermia (stosowanie wysokiej temperatury)												
Inna metoda biotechniczna (np. plastry pułapki, całkowite usuwanie czerwiu, izolowanie matki)												
Kwas mrówkowy – krótkoterminowo (do 3 dni)												
Kwas mrówkowy – długoterminowo												
Kwas szczawiowy – nakrapianie (Oxybee, Varromed)												
Kwas szczawiowy – sublimacja (odparowanie)												
Tymol (np. Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)												
Flumetryna (Bayvarol, PolyVar Yellow)												
Amitraz w paskach (Biowar, Apivar)												
Ile pasków na ul wprowadzono i jak długo w ulu pozostawały?												
Amitraz – tabletki do odymiania (Apiwarol)												
Ile razy i w jakich odstępach przeprowadzono odymianie?												
Inny produkt chemiczny (.....)												
Inna metoda (.....)												

21 W większości swoich rodzin stosuję:

a) osiatkowane dennice zimą	a) tak	b) nie	c) nie wiem
b) ocieplane ule	a) tak	b) nie	c) nie wiem
c) plastikowe ule	a) tak	b) nie	c) nie wiem
d) certyfikowane pszczelarstwo organiczne	a) tak	b) nie	c) nie wiem
e) linie pszczół „odporne” na <i>Varroa</i>	a) tak	b) nie	c) nie wiem
f) plastry o małych komórkach (5,1 mm lub mniej)	a) tak	b) nie	c) nie wiem
g) naturalne plastry (bez węzy)	a) tak	b) nie	c) nie wiem
h) nabywanie wosku/węzy spoza pasieki	a) tak	b) nie	c) nie wiem

22 Jeżeli w pasiece w sezonie 2019 wystąpiły objawy nasuwające podejrzenie ostrego zatrucia pszczół (nagłe pojawienie się przed wylotkami większości uli dużej liczby martwych lub porażonych pszczół) to w jakim to było miesiącu/miesiącach?

Nie wiem